

**Exercice 1.** Soit  $G$  un groupe. Montrer que toute intersection de sous-groupes de  $G$  est encore un sous-groupe de  $G$ .

**Exercice 2.** Soit  $G$  un groupe. Soient  $A$  et  $B$  deux sous-groupes de  $G$ . Montrer que  $A \cup B$  est un sous-groupe de  $G$  si et seulement si  $A \subset B$  ou  $B \subset A$ .

**Exercice 3.** Soient  $(G, \times)$  et  $(H, \star)$  deux groupes. On définit une opération  $\otimes$  sur  $G \times H$  en posant

$$(x, y) \otimes (x', y') = (x \times x', y \star y')$$

Montrer que, muni de cette opération,  $G \times H$  est un groupe.

**Exercice 4.** Soit  $G$  un groupe dans lequel tout élément est égal à son inverse. Montrer que  $G$  est abélien.

**Exercice 5.** Soit  $\star$  l'opération définie sur  $\mathbb{R}$  par

$$\forall x, y \in \mathbb{R}, x \star y = x + y + xy$$

Soit  $G = \mathbb{R} \setminus \{-1\}$ . Montrer que  $(G, \star)$  est un groupe abélien isomorphe à  $(\mathbb{R}^*, \times)$ .

**Exercice 6.** On pose, pour  $x, y \in \mathbb{R}$ ,

$$x \star y = \sqrt[3]{x^3 + y^3}$$

Montrer que  $(\mathbb{R}, \star)$  est un groupe abélien isomorphe à  $(\mathbb{R}, +)$ .

**Exercice 7.** Isomorphes ou pas ?

1.  $(\mathbb{R}^*, \times)$  est-il isomorphe à  $(\mathbb{R}, +)$  ?
2.  $(\mathbb{R}_+^*, \times)$  est-il isomorphe à  $(\mathbb{R}, +)$  ?
3.  $(\mathbb{Q}, +)$  est-il isomorphe à  $(\mathbb{Z}, +)$  ?
4. Prouver que  $(\mathbb{R}^*, \times)$  est isomorphe à  $\mathbb{R} \times \{-1, 1\}$  (cf exercice 3).
5.  $(\mathbb{R}, +)$  est-il isomorphe à  $(\mathbb{C}, +)$  ?

**Exercice 8.** On note  $\widehat{\mathbb{R}} = \mathbb{R} \cup \{\omega\}$ , où  $\omega$  est un symbole sans signification particulière. Soient  $f$  et  $g : \widehat{\mathbb{R}} \rightarrow \widehat{\mathbb{R}}$  définies par

- $\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = 1 - x$  et  $f(\omega) = \omega$ .
- $\forall x \in \mathbb{R}^*, g(x) = \frac{1}{x}$ ,  $g(0) = \omega$  et  $g(\omega) = 0$ .

Déterminer le plus petit sous-groupe de  $\mathfrak{S}(\widehat{\mathbb{R}})$  contenant  $f$  et  $g$ .

**Exercice 9.** Soit  $(G, +)$  un groupe abélien de neutre 0.  $G_1$  et  $G_2$  étant deux sous-groupes de  $G$ , on pose

$$G_1 + G_2 = \{x_1 + x_2, x_1 \in G_1, x_2 \in G_2\}$$

1. Montrer que  $G_1 + G_2$  est un sous-groupe de  $G$ .
2. Montrer que si  $G_1 \cap G_2 = \{0\}$ , alors les groupes  $G_1 + G_2$  et  $G_1 \times G_2$  sont isomorphes.

**Exercice 10.** Soit  $G$  un sous-groupe de  $(\mathbb{R}, +)$  différent de  $\{0\}$ .

1. Montrer que  $G_+^* = \{x \in G, x > 0\}$  possède une borne inférieure. On note celle-ci  $\alpha$ .
2. On suppose  $\alpha = 0$ . Prouver que  $G$  est dense dans  $\mathbb{R}$  (utiliser la propriété d'Archimède).

3. On suppose  $\alpha > 0$ . Montrer que  $\alpha \in G$  (on pourra raisonner par l'absurde), puis prouver que  $G = \alpha\mathbb{Z}$  (adapter la démonstration faite en cours sur les sous-groupes de  $\mathbb{Z}$ ).

*Les sous-groupes de  $\mathbb{R}$  se divisent ainsi en deux familles : les sous-groupes de la forme  $\alpha\mathbb{Z}$  où  $\alpha \geq 0$  sont dits discrets. Par exemple,  $\mathbb{Z}$  fait partie de cette famille de sous-groupes. Les sous-groupes qui ne font pas partie de la première famille sont denses dans  $\mathbb{R}$ . Un exemple en est  $\mathbb{Q}$ .*

**Exercice 11.** Soient  $\alpha, \beta$  deux réels strictement positifs. Soit  $G = \{m\alpha + n\beta, m, n \in \mathbb{Z}\}$ .

1. Montrer que  $G$  est un sous-groupe de  $\mathbb{R}$ .
2. Montrer que  $G$  est dense dans  $\mathbb{R}$  si et seulement si le quotient  $\frac{\beta}{\alpha}$  est irrationnel.

**Exercice 12.** Soit  $c$  un réel strictement positif. Soit  $E = ]-c, c[$ . Pour  $x, y \in E$ , on pose

$$x \star y = c^2 \frac{x + y}{xy + c^2}$$

1. Montrer que  $\star$  est une loi de composition interne sur  $E$ .
2. Montrer que  $(E, \star)$  est un groupe abélien.

**Exercice 13.** Pour tout  $a \in \mathbb{C}^*$  et tout  $b \in \mathbb{C}$ , on définit  $f_{a,b} : \mathbb{C} \longrightarrow \mathbb{C}$  en posant, pour tout  $z \in \mathbb{C}$ ,

$$f_{a,b}(z) = az + b$$

Soit

$$\mathcal{S} = \{f_{a,b}, a \in \mathbb{C}^*, b \in \mathbb{C}\}$$

Montrer que  $(\mathcal{S}, \circ)$  est un groupe. Ce groupe est-il abélien ?

**Exercice 14.** Les anneaux ci-dessous sont-ils isomorphes ?

1.  $\mathbb{Z}$  et  $\mathbb{Q}$ .
2.  $\mathbb{R}$  et  $\mathbb{C}$ .

**Exercice 15.** Soit  $\mathbb{A}$  un anneau. On suppose que l'application  $f : \mathbb{A} \longrightarrow \mathbb{A}$  définie par  $f(x) = x^2$  est un endomorphisme du groupe  $(\mathbb{A}, +)$ .

1. Prouver que  $\forall x, y \in \mathbb{A}, xy = -yx$  (considérer  $(x + y)^2$ ).
2. Montrer que  $\forall x \in \mathbb{A}, x = -x$  et en déduire que l'anneau  $\mathbb{A}$  est commutatif.
3. Montrer que  $f$  est un endomorphisme de l'anneau  $\mathbb{A}$ .

**Exercice 16.** Soit  $\mathbb{A}$  un anneau commutatif. On appelle *élément nilpotent* de  $\mathbb{A}$  tout  $x \in \mathbb{A}$  vérifiant

$$\exists n \in \mathbb{N}, x^n = 0$$

On note  $\mathcal{N}$  l'ensemble des éléments nilpotents de  $\mathbb{A}$ .

1. Montrer que  $\mathcal{N}$  est stable pour la multiplication.
2. Montrer que  $\mathcal{N}$  est stable par passage à l'opposé.
3. Montrer que  $\mathcal{N}$  est stable pour l'addition.
4.  $\mathcal{N}$  est-il un sous-anneau de  $\mathbb{A}$  ?

**Exercice 17.** Soit  $\mathbb{A}$  un sous-anneau de  $\mathbb{R}$ . On note  $\mathbb{A}_+^* = \mathbb{A} \cap \mathbb{R}_+^*$ .

1. Prouver l'existence de  $\alpha = \inf \mathbb{A}_+^*$ .
2. Montrer que  $\alpha = 1$  ou  $\alpha = 0$ .
3. On suppose  $\alpha = 1$ . Montrer que  $\mathbb{A} = \mathbb{Z}$ .
4. On suppose  $\alpha = 0$ . Montrer que  $\mathbb{A}$  est dense dans  $\mathbb{R}$ .